


Schwindel

Stand September 2021

Unter dem Begriff Schwindel berichten Patienten wesentlich häufiger über uncharakteristische Symptome wie Unsicherheitsgefühl, tunnelartiges Entrücktsein oder Angstempfinden als über Dreh- oder Schwindel im engeren Sinne. Wichtig sind Zusatzsymptome wie Übelkeit/Erbrechen, Doppelbilder, Sturzneigung oder Hörminderung/Tinnitus. Auch zeitlicher Verlauf und auslösende Faktoren (Lageänderung) sind bedeutsam.

Tachykardien sowohl aufgrund kardiogener Herzrhythmusstörungen als auch bei episodischen Angststörungen (Panikattacken) können von Schwindel begleitet sein. Kreislaufstörungen gehen eher mit Einengungen des Gesichtsfeldes (Tunnelblick) einher. Von Bedeutung ist die Bildgebung (meist MRT des Kleinhirnbrückenwinkels mit oder ohne MR-Angiographie) vor allem als Ausschlussdiagnostik zu im engeren Sinne HNO-ärztlichen Diagnosen wie Labyrinthitis, Lage- rungsschwindel oder M. Menière.




Carotisverschluss rechts 1 Woche nach Covid Impfung




Dünnschicht-MRT des Kleinhirnbrückenwinkels o.B.




KM-gestützte MR-Angiographie extrakranielle hirnversorgende Arterien





Time of Flight MR-Angiographie der intrakraniellen Hirnarterien ohne Kontrastmittel o.B.




Mammakarzinom mit Hirnmetastasen MRT T1KM




Kleinhirnblutung MRT



Lungenkrebs Schädelbasismetastase M. Menière
FDG-PET/CT


Vestibularisschwannom links MRT T1 mit KM



Mammakarzinom Hirnmetastasen
MRT Diffusionswichtung DWI resolve



„Akustikusneurinom“ Vestibularisschwannom
MRT T2W




Cerebellaerer Hypometabolismus PICA Direktabgang
FDG-PET VR




Cerebellaerer Insult PICA Direktabgang
FDG-PET VR



Aneurysma A vertebralis rechts
MR-Angiographie mit KM



Haemangioblastom "cyst and mural nodule"
MRT T1W mit KM coronar



Arachnoidalzyste des Kleinhirnbrückenwinkels
MRT T2W Dünnschicht VR